

NZOZ nr 1 Endoskopia
Miłosza 3 Rumia
tel: 58 72 72 404

Przygotowanie do gastrokopii

1. W dniu poprzedzającym badanie lekkostrawna kolacja ok godz. 17-18
Proszę nie jeść kleików.
2. W dniu badania przychodzimy na czczo: nic nie jeść!!!!
3. Płynny należy skończyć pić 7h przed badaniem.
4. W dniu badania nie palić papierosów i żuć gumi.
5. Nie brać leków zobowiązujących kwas żołądkowy, np. Polprazol, Controloc, Helicid, Ranigast (odstawić 14 dni przed badaniem).
6. Osoby stale przyjmujące leki np. na nadciśnienie tętnicze, choroby serca, padaczkę, powinny zażyć normalną dzienną dawkę swoich leków popijając małą ilością wody
7. Osoby przyjmujące preparaty żelaza, powinny zaprzestać przyjmowania preparatu :
siedem dni przed badaniem

UWAGA PACJENCI PRZYJMUJĄCY :

a) **leki antyagregacyjne:** kwas acetylosacylowy (Aspiryna, Polocard, Acard, Acesan i inne preparaty) tiklopidyna (Aclotin, Ticlo, i inne preparaty) kłopidogrel (Areplex, Plavix, Clopidix i inne preparaty), prasugrel (Efient), Tikagrelor (Brilique)

b) **leki przeciwzakrzepowe:** Sintrom, Syncumar, Acenocumarol, Warfaryna, Eliquis, Pradaxa, Xarelto

powinni skonsultować się około 7 dni przed badaniem z lekarzem prowadzącym w celu odstawienia leku lub ewentualnej modyfikacji stosowanej terapii.

Pacjenci z cukrzycą powinni zaprzestać przyjmowania doustnych leków hypoglikemizujących lub insuliny w czasie pozostawania na czczo (w okresie bez przyjmowania pokarmów, gęstych płynów, kawy i herbaty). Powinni zapisać się na badanie rano - **należy poinformować o tym rejestrację.**

JEŻELI BADANIE JEST W ZNIECZULENIU: PŁYNY NALEŻY

SKOŃCZYĆ PIĆ 7 GODZ PRZED BADANIEM

DODATKOWO przyjść z osobą towarzyszącą

Nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych przez co najmniej

12 godz po zabiegu.

Leki wpływają na koncentrację, refleks i zdolność oceny sytuacji nawet po odzyskaniu świadomości

**PAMIĘTAJ, ŻE JAZDA POD WPLYWEM ŚRODKÓW UPOŚLEDZAJĄCYCH
SPRAWNOŚĆ PSYCHOMOTORYCZNĄ MOŻE BYĆ TRAKTOWANA PODOBNI
JAK JAZDA POD WPLYWEM ALKOHOLU!!**